



Pruebas de detección de cáncer de pulmón

Otro programa de servicio social de Northside Hospital Cancer Institute




¿Quién debe hacerse la prueba de detección?

Si usted es fumador o exfumador, hable con su médico para analizar los riesgos y ventajas de una tomografía axial computarizada de dosis bajas de radiación.

Criterios de selección*

Edad	55 - 77 años
Síntomas	Asintomático (no hay signos ni síntomas de cáncer de pulmón).
Antecedentes tabáquicos	Es fumador activo o ha abandonado el tabaco en los últimos 15 años con antecedentes de haber fumado 30 paquetes de cigarrillos o más en un año (un paquete al día durante 30 años o más).
Duración de la prueba	La prueba de detección debe interrumpirse una vez que la persona ha estado 15 años sin fumar.
Toma de decisiones compartida	Se requiere una prueba de detección y una visita para toma de decisiones para determinar si reúne las condiciones necesarias y para que se le realice una prueba de detección de cáncer de pulmón mediante una tomografía computarizada de baja dosis de radiación.



PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR

Como parte de nuestro enfoque integral preventivo y de detección temprana, Northside ofrece un programa de deshabituación tabáquica para ayudar a las personas que desean dejar de fumar. Para obtener más información llame al (404) 780-7653 o envíe un correo electrónico a smokingcessation@northside.com

Debe tener una orden del médico por escrito.
*La selección se basa en los criterios de Medicare.

Comuníquese con Northside Hospital Cancer Institute al (404) 531-4444 para cualquier pregunta o para saber si reúne las condiciones.