

Proceso para las pruebas de detección de COVID-19 para pacientes recuperados de COVID-19

La evaluación preoperatoria de un paciente quirúrgico recuperándose de COVID-19 implica la optimización de las condiciones médicas y el estado fisiológico del paciente. Dado que la COVID-19 puede afectar casi todos los aparatos y sistemas principales del cuerpo, el momento adecuado de una intervención quirúrgica tras el diagnóstico de la COVID-19 es importante al considerar el riesgo de complicaciones postoperatorias.

A partir de las recomendaciones de Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. CDC, siglas en inglés) para suspender el aislamiento y la orientación de American Society of Anesthesiologists (Sociedad Americana de Anestesiólogos. ASA, siglas en inglés) y de Anesthesia Patient Safety Foundation (Fundación para la Seguridad del Paciente en Anestesia. ASPF, siglas en inglés) para clasificar al paciente como no infeccioso, Northside Hospital añadió lo siguiente, con fecha de entrada en vigor inmediata, al tiempo de espera sugerido desde la fecha de diagnóstico de la COVID-19 hasta la cirugía electiva:

Programación de una cirugía tras la aparición de la enfermedad COVID-19	Síntomas
Una (1) semana	<ul style="list-style-type: none">Para los pacientes asintomáticos que arrojaron resultados positivos en la prueba de COVID-19
Cuatro (4) semanas	<ul style="list-style-type: none">Para un paciente que se recupera de sólo síntomas leves no respiratorios
Seis (6) semanas	<ul style="list-style-type: none">Para un paciente sintomático (por ej.: tos, dificultad para respirar) que no tuvo que ser ingresado
Ocho (8) a diez (10) semanas	<ul style="list-style-type: none">Para un paciente sintomático con diabetes, inmunodeprimido o que fue ingresado
Doce (12) semanas	<ul style="list-style-type: none">Para un paciente que fue ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos debido a una infección por COVID-19

Para los pacientes que requieren procedimientos urgentes o emergentes y que quedan fuera de las recomendaciones presentadas: se seguirán evaluando de manera individual.

